

NAVODILO ZA UPORABO

ASPIRIN migran 500 mg šumeče tablete acetilsalicilna kislina

Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate uporabljati pazljivo in skrbno, da vam bo kar najboljše koristilo.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če se znaki vaše bolezni ne izboljšajo v treh dneh, se posvetujte z zdravnikom.
- Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

Navodilo vsebuje:

1. Kaj je zdravilo Aspirin migran 500 mg šumeče tablete in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Aspirin migran 500 mg šumeče tablete
3. Kako jemati zdravilo Aspirin migran 500 mg šumeče tablete
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Aspirin migran 500 mg šumeče tablete
6. Dodatne informacije

1. KAJ JE ZDRAVILO ASPIRIN MIGRAN 500 MG ŠUMEČE TABLETE IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO

Acetilsalicilna kislina spada v skupino nesteroidnih protivnetnih zdravil z analgetičnim, antipiretičnim in protivnetnim delovanjem (lajša bolečine, znižuje zvišano telesno temperaturo in deluje protivnetno).

Aspirin migran se uporablja za akutno zdravljenje glavobola pri napadih migrene z avro ali brez nje.

2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE VZELI ZDRAVILO ASPIRIN MIGRAN 500 MG ŠUMEČE TABLETE

Ne jemljite zdravila Aspirin migran:

- če ste alergični (preobčutljivi) na acetilsalicilno kislino in druge salicilate ali katerokoli sestavino zdravila,
- pri povečani nagnjenosti h krvavitvam,
- imate akutno razjedo na želodcu ali dvanajstniku,
- ste v zadnjem trimesečju nosečnosti.

Bodite posebno pozorni pri jemanju zdravila Aspirin migran, če

- ste alergični (preobčutljivi) na druga protivnetna zdravila, antirevmatike ali druge alergenske snovi,
- imate astmo,
- se hkrati zdravite z zdravili, ki vsebujejo kortikosteroide ali z drugimi protibolečinskimi ali protivnetnimi zdravili,
- se hkrati zdravite z antikoagulansi ali z zaviralci agregacije trombocitov (ki preprečujejo strjevanje krvi), z zdravili za: zniževanje vrednosti sladkorja v krvi (če imate sladkorno

- bolezen), izločanje sečne kisline, zmanjševanje zastoja vode v telesu ali za zniževanje krvnega tlaka,
- imate jetrne ali ledvične težave,
 - imate v anamnezi bolezni prebavil.

Otroci in mladostniki

Zaradi možnosti pojava Reyevega sindroma (redke, a hude bolezni) lahko zdravila, ki vsebujejo acetilsalicilno kislino, jemljete le po predhodnem zdravniškem posvetu.

To zdravilo spada v skupino zdravil, ki lahko zmanjšajo plodnost pri ženskah. Učinek po prenehanju uporabe zdravila izgine.

Jemanje drugih zdravil

Obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, če jemljete ali ste pred kratkim jemali katerokoli zdravilo, tudi če ste ga dobili brez recepta.

Če zdravilo jemljete hkrati z zdravili, kot so metotreksat, digoksin, barbiturati, litij, valprojska kislina, fenitoin, selektivni zaviralci privzema serotonina (zdravila za zdravljenje depresije) ali sulfonamidi, morate to povedati svojemu zdravniku.

Če jemljete zdravila z acetilsalicilno kislino, se morate pred vsakim kirurškim posegom posvetovati z zdravnikom oziroma zobozdravnikom.

Jemanje zdravila Aspirin migran skupaj s hrano in pijačo

Sočasno pitje alkoholnih pijač poveča nevarnost krvavitve iz prebavil.

Nosečnost in dojenje

Posvetujte se z zdravnikom ali s farmacevtom, preden vzamete katerokoli zdravilo.

Uporaba zdravila Aspirin migran lahko škodljivo vpliva na nosečnost in/ali razvoj plodu. V prvem in drugem trimesečju nosečnosti ne smete uporabljati zdravila Aspirin migran tablete razen, če je to nujno potrebno. Če poskušate zanositi ali ste nosečnica v prvem oziroma drugem trimesečju nosečnosti, naj bo odmerek zdravila čim manjši in trajanje zdravljenja čim krajše. Zdravila Aspirin migran ne smete jemati v zadnjem trimesečju nosečnosti.

O uporabi zdravila Aspirin migran med dojenjem se posvetujte z zdravnikom. Majhne količine salicilatov prehajajo v materino mleko. Matere, ki redno ali v velikih odmerkih jemljejo zdravilo morajo že zelo zgodaj opustiti dojenje; pri novorojenčkih, katere matere so občasno jemale zdravilo, niso opazali neželenih učinkov, zato dojenja običajno ni treba prekinjati.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Podatkov o vplivu zdravila na sposobnost upravljanja vozil ali strojev ni.

Pomembne informacije o nekaterih sestavinah zdravila Aspirin migran

Zdravilo vsebuje 543 mg natrija, kar bi vam lahko škodilo, če ste na dieti z nadzorovanim vnosom natrija.

3. KAKO JEMATI ZDRAVILO ASPIRIN MIGRAN 500 MG ŠUMEČE TABLETE

Pri jemanju zdravila Aspirin migran natančno upoštevajte zdravnikova navodila. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Običajni odmerek za odrasle je 2 šumeči tableti v enkratnem odmerku. Če napad ne popusti, lahko odmerek ponavljate na 4 do 8 ur. Največji dnevni odmerek je 6 šumečih tablet in ga ne smete prekoračiti.

Dve šumeči tableti raztopite v kozarcu vode in popijte.

Zdravila Aspirin migran ne smete jemati več kot tri dni, ne da bi se o tem posvetovali z zdravnikom. Če simptomi ne minejo, je treba premisliti o drugi obliki zdravljenja.

Če ste vzeli večji odmerek zdravila Aspirin migran, kot bi smeli

Če ste vzeli večji odmerek zdravila Aspirin migran, kot bi smeli, se takoj posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Če ste vzeli večji odmerek zdravila, kot bi smeli, o tem takoj obvestite zdravnika, ki se bo za nadaljnje ukrepanje odločil glede na znake ali simptome zastrupitve.

Simptomi zaužitja prevelikega odmerka so: omotičnost, vrtoglavica, zvonjenje v ušesih, motnje sluha, znojenje, slabost, bruhanje, glavobol in zmedenost.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Kot vsa zdravila ima lahko tudi Aspirin migran neželene učinke, ki pa se ne pojavljajo pri vseh bolnikih.

V razvrstitvah pogostnosti so neželeni učinki navedeni po padajoči resnosti.

Zelo pogosti: pojavijo se pri več kot 1 od 10 bolnikov
Pogosti: pojavijo se pri 1 do 10 bolnikih od 100 bolnikov
Občasni: pojavijo se pri 1 do 10 bolnikih od 1.000 bolnikov
Redki: pojavijo se pri 1 do 10 bolnikih od 10.000 bolnikov
Zelo redki: pojavijo se pri manj kot 1 bolniku od 10.000 bolnikov
Neznana pogostnost: pogostnosti iz razpoložljivih podatkov ni mogoče oceniti

Bolezni prebavil

Pogosto se lahko pojavijo prebavne težave kot so splošni znaki in simptomi dispepsije (motnje prebavne funkcije) in bolečine v trebuhu, občasno pa vnetja prebavil, razjede v prebavilih, ki lahko, vendar v zelo redkih primerih privedejo do krvavitve in perforacije (predrtja).

Bolezni krvi in limfatičnega sistema

Acetilsalicilna kislina zavira agregacijo trombocitov (zlepljanje krvnih ploščic), zato se lahko med njenim jemanjem poveča nevarnost krvavitve. Opazili so krvavitve, kot so krvavitve med operacijami, hematome (izliva krvi v mehko tkivo), krvavitve iz nosu, sečil, spolovil in dlesni. Redko oz. zelo redko so poročali o hudih krvavitvah, kot so krvavitve v prebavilih (hematemeza (bruhanje krvi iz želodca ali požiralnika), melena (črno blato)), krvavitve v možganih (predvsem pri bolnikih z neurejeno hipertenzijo in/ali bolnikih, ki jemljejo zdravila za preprečevanje strjevanja krvi), ki so lahko v posameznih primerih življenjsko ogrožujoče. Krvavitve lahko povzročijo slabokrvnost zaradi pomanjkanja železa, za katero so značilni znaki in simptomi, kot so pomanjkanje ali izguba moči in energije, bledica in zmanjšana prekrvavitev organa ali tkiva (hipoperfuzija).

Bolezni imunskega sistema

Pojavijo se lahko preobčutljivostne reakcije, kot so sindrom astme, blage do zmerne reakcije, ki lahko prizadanejo kožo, dihala, prebavila in srčnožilni sistem, vključno s simptomi kot so izpuščaji, koprivnica, edem, srbenje, vnetje nosne sluznice, zamašitev nosu, prizadetostjo srčnodihalnega sistema in zelo redko hude reakcije z anafilaktičnim šokom (šokom zaradi takojšnje preobčutljivosti).

Bolezni jeter, žolčnika in žolčevodov

Zelo redko se lahko pojavijo motnje jetrnega delovanja (povečana vrednost transaminaz).

Bolezni živčevja

Vrtoglavica in zvonjenje v ušesih se lahko pojavita kot simptoma po zaužitju prevelikega odmerka.

Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA ASPIRIN MIGRAN 500 MG ŠUMEČE TABLETE

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Zdravila Aspirin migran ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini. Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne potrebujete več, se posvetujte s farmacevtom. Takšni ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. DODATNE INFORMACIJE

Kaj vsebuje zdravilo Aspirin migran

- Zdravilna učinkovina je acetilsalicilna kislina.
- Pomožne snovi so: natrijev dihidrogencitrat, natrijev hidrogenkarbonat, brezvodna citronska kislina, brezvodni natrijev karbonat

1 šumeča tableta vsebuje 500 mg acetilsalicilne kisline. Tableta vsebuje 543 mg natrija.

Izgled zdravila Aspirin migran in vsebina pakiranja

Bele, okrogle tablete z napisom Bayer na eni strani.

Aspirin migran je na voljo v škatli z 12 šumečimi tabletami (6 x 2 šumeči tableti v dvojnem traku (Al/papir)).

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom

Bayer d. o. o., Bravničarjeva 13, 1000 Ljubljana

Izdelovalec

Bayer Bitterfeld GmbH, 06803 Greppin, Nemčija

Način in režim izdajanja zdravila

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah.

Navodilo je bilo odobreno

14. 04. 2010